



Procéder au prélèvement :



Nettoyez soigneusement vos mains au savon.
Réalisez **une toilette intime** à l'eau savonneuse ou avec une lingette antiseptique



Ouvrez le pot de recueil au dernier moment.



Éliminez le premier jet d'urine dans les toilettes.
Recueillez ensuite l'urine en **milieu de jet** dans le pot.
Remplir le flacon au 1/2 minimum

ATTENTION!



Ne touchez pas la canule intégrée.



Ne soulevez pas l'étiquette blanche sur le couvercle du pot : risque de blessure !

Préparer le prélèvement



Refermez le flacon de façon hermétique.
Identifiez le flacon avec votre nom, nom de naissance, prénom et date de naissance
Placez le flacon dans le sachet de transport et fermez-le soigneusement.



APPORTER LE FLACON RAPIDEMENT AU LABORATOIRE

Dans l'heure qui suit à température ambiante ou à défaut dans les 12 h si conservation entre 2 et 8°C (réfrigérateur).

Retrouvez toutes les consignes de prélèvements sur : www.bioptima.fr

Remplir la fiche de suivi du prélèvement et renseignements cliniques

Etiquette GED
Réservé au laboratoire

◆ PATIENT

Nom : Prénom :
Nom de naissance :
Date de naissance : Sexe : F H
Adresse : Téléphone :
.....

◆ RESULTATS

- Au laboratoire
- Par la poste
- Par internet
- A la pharmacie :

◆ PRELEVEMENT

Date du recueil : Heure du recueil : Urines mises au réfrigérateur : OUI NON
 Milieu de jet Sondage aller / retour Sonde à demeure Penilex

◆ RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Avez-vous des symptômes d'infection urinaire ?

- Douleurs (à la miction, en bas du ventre)
- Fièvre
- Brûlure
- Mictions fréquentes
- Incontinence
- Douleurs lombaires

Vous n'avez pas de symptômes d'infection urinaire ?

- Contrôle après traitement antibiotique (à réaliser 4 jrs après l'arrêt du traitement)
- Avant intervention des ou par les voies urinaires
- Après intervention des ou par les voies urinaires
- Suivi de grossesse
- Autres :

Avez-vous un traitement antibiotique ?

- Pas de traitement
- Antibiotique en cours
- Antibiotique arrêté le
- Nom de l'antibiotique :
- Antibiotique à débiter après le recueil des urines
- Nom de l'antibiotique :

◆ POUR LE LABORATOIRE : Conforme Non-conforme

