




Retrouvez toutes les consignes de prélèvements sur : www.bioptima.fr

Procéder au prélèvement par écouvillonnage nasal

Maintenir la tête du patient inclinée en arrière. Insérer l'écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais. Le laisser en place quelques secondes puis le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif. Procéder de même pour l'autre narine avec le même écouvillon.



Préparer le prélèvement



Casser la tige de l'écouvillon au niveau de la marque, puis placer dans le tube fourni.

! Ne pas vider le liquide de conservation.

Identifier les échantillons (Nom, nom de naissance, prénom, date de naissance).

Placer le tube dans le sachet, avec cette fiche et la prescription.

ACHEMINEMENT AU LABORATOIRE :
12 HEURES Max. (entre 15 – 25°C)

Remplir la fiche de suivi du prélèvement

◆ PATIENT

Nom : Prénom :

Nom de naissance :

Date de naissance : Sexe : F H

Adresse : Téléphone :

Etiquette GED

Réservé au laboratoire

◆ PRELEVEMENT

Nom du préleveur :

Date du recueil : Heure du recueil :

◆ RESULTATS

- Au laboratoire
- Par la poste
- Par internet (n° de portable obligatoire)
- A la pharmacie :

◆ RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Rappel : suite à la décision parue au Journal officiel du 15 février 2011, la recherche de Bordetella par PCR ne doit être effectuée que si le sujet tousse depuis moins de 3 semaines et s'il est vacciné depuis plus de 3 ans ou si son statut vaccinal est inconnu. L'examen peut être réalisé en dehors de ces exigences, il sera alors facturé **39 euros** et nécessite un accord préalable.

Toux depuis moins de 3 semaines : OUI NON

☞ (accord du patient pour régler 39 euros : OUI NON

Sujet vacciné depuis plus de 3 ans : OUI NON Statut inconnu

◆ POUR LE LABORATOIRE : Conforme Non-conforme

