



PRELEVEMENTS POUR RECHERCHE D'HERPES (HSV1 et HSV2)

Retrouvez toutes les consignes de prélèvement sur www.bioptima.fr



1 écouvillon TRANSWAB
(milieu liquide, bouchon violet)

Prélever au niveau du plancher de l'ulcération

Casser la tige dans le tube au niveau de la marque.

Ne pas vider le liquide de conservation

Identifier les échantillons
(Nom, nom de naissance, prénom, date de naissance)

Placer le tube dans le sachet avec cette fiche et la prescription

Délai d'acheminement au laboratoire
12 heures (entre 15 - 25°C)

PATIENT :

Nom : Prénom :
Nom de naissance : Date de naissance :
Adresse : Téléphone :

RESULTATS :

- au laboratoire par la poste à la pharmacie de.....
 par internet (n° de téléphone portable indispensable)

PRELEVEMENT : Site anatomique de prélèvement :

Préleveur :

Date du prélèvement : Heure du prélèvement :

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

Prise récente d'antiviral ? NON OUI : En cours depuis Arrêté depuis

Renseignements cliniques : (taille, aspect de la lésion, date d'apparition...)

.....
.....

Réservé au laboratoire : conforme non conforme